

# 당뇨 환자의 18F-FDG PET/CT 검사 준비를 위한 안내

## 공통 사항



4시간 금식



혈당 150mg/dl 이하로 조절



복용 중인 당뇨약 지참

### 경구 혈당강하제를 복용하는 경우

→ 메트포르민 또는 메트포르민 복합 제제 성분 함유 여부 확인

### 인슐린을 투약하는 경우

메트포르민 함유 X

메트포르민 함유 O

(초) 속효성

중간형/지속형/복합제제

인슐린 펌프



평소대로 복용하고 내원



12시간  
검사 12시간 전 복용 중지



4시간  
검사 4시간 전 투약 중지



12시간  
검사 12시간 전 투약 중지



PET 검사실로 문의  
02-3010-5421~2

메포민, 메트포민, 메트포르민, 메포닌, 구루메포민, 그루타민, 디포민, 엠포민, 메토플, 메기풀민, 글루파, 글루파코지, 글루코다운, 글루메트, 다이아벡스, 노보틴 슈다운, 다이비스, 아마릴렉스, 자누메트, 자누메트 XR 서방정, 보그메트, 가브스메트, 네시나액트, 트라젠타듀오, 콤비클라이자 XR 서방정 등

**초속효성 인슐린**  
예) 휴마로그 퀵펜, 노보래피드 주, 애피드라 주 등

**속효성 인슐린**  
예) 휴물린 알 주 등

**중간형 제제**  
예) 휴물린 엔 주, 휴물린 엔 퀵펜 등  
**지속형 제제**  
예) 란투스 주, 란투스 솔로스타, 래버미어 플렉스 펜  
**복합제제**  
예) 노보믹스 플렉스펜, 휴마로그 믹스 카트리지, 휴마로그 믹스 퀵펜 등

**투약 중인 약 또는 인슐린을 모르는 경우, 처방 받은 병원 또는 약국으로 문의하시기 바랍니다.**

※ 정맥 혈당이 150mg/dl 이하일 경우만 검사가 가능합니다. 만약 150mg/dl 이상일 경우 검사가 지연되거나 다른 날로 변경될 수 있습니다.

※ 저혈당증세(식은땀, 현기증 등)가 있는 경우에는 반드시 PET 검사실로 먼저 문의하고 추후 필요한 조치를 진행합니다.



서울아산병원 핵의학과